



Medicinering under  
akutpsykiatrisk vård

Akutpsykiatrisk vård  
Maj 2017


Michael Rangne  
Överläkare, specialist i psykiatri  
mrange@gmail.com  
www.lorami.se  
Maj 2017

A cartoon character wearing a black cap and glasses stands to the right of the oval, with a blue arrow pointing towards the text. The slide is decorated with four stylized flowers: a pink one in the top-left, a light pink one in the top-right, a cyan one in the bottom-left, and a blue one in the bottom-right.



Del 1:  
Läkemedelsbehandling

A cartoon character wearing a black cap and glasses stands to the right of the cloud shape. The slide is decorated with four stylized flowers: a pink one in the top-left, a light pink one in the top-right, a cyan one in the bottom-left, and a light green one in the bottom-right.



Några platser där man skulle kunna hoppas på nationella evidensbaserade lathundar för behandling av akuta tillstånd

- [www.psykiatristod.se](http://www.psykiatristod.se)
- [www.sbu.se](http://www.sbu.se)
- [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se)
- [www.lakemedelsboken.se](http://www.lakemedelsboken.se)

- Cochrane och NICE har riktlinjer
- På psykiatristod.se och på NSP's intranät finns vissa rekommendationer, **men de slutar ungefär där svårigheterna börjar, dvs där patienten inte svarar på denna behandling.**

## Några informationskällor

- [www.lakemedelsboken.se](http://www.lakemedelsboken.se)
- [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)
- [klokalistan.janusinfo.se/2016/Psykiatri/](http://klokalistan.janusinfo.se/2016/Psykiatri/)
- [www1.psykiatristod.se/psykiatristod/](http://www1.psykiatristod.se/psykiatristod/)
- [www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/hantering-av-hot-och-vald-inom-psykiatri--val-av-lakemedel-for-sedering-i-akuta-situationer/](http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/hantering-av-hot-och-vald-inom-psykiatri--val-av-lakemedel-for-sedering-i-akuta-situationer/)
- [www.sbu.se](http://www.sbu.se)
- [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)
- [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se)
- [www.viss.nu](http://www.viss.nu)

## Några orsaker till agitation


"Ospecifikt tillstånd av överdriven och dåligt organiserad psykomotorisk aktivitet orsakad av fysiskt eller psykiskt obehag."

- Somatisk sjukdom
- Substanspåverkan
- Abstinens
- Utvecklingsstörning
  
- Psykos
- Mani
- Äldre med demens och BPSD
- Personlighetsstörning, f f a emotionell instabilitet, narcissism, antisociala drag
- Autismspektrumstörning
- ADHD

## Patienter med ökad risk för våld

- Demens och annan kognitiv nedsättning.
- Berusning och annan drogpåverkan.
- Abstinens.
- Mani.
- Psykos.
- Imperativ hörselhallucinos.
- Personlighetsstörning (narcissism, borderline, histrionisk, antisocial).
- Depression (män).
- ADHD.
- Autismspektrumstörning.
- Utvecklingsstörning.



10



11

Vilken del av hjärnan är för tillfället inkopplad?

**Neocortex, "grön zon":**  
Intellekt, empati, humor, vädja, be, resonera...

**Limbiska systemet, "röd zon":** Känslor, drifter, självkänsla, religion, värderingar...

**Reptilhjärnan:**  
Flykt, anfall, spela död...

12

Tack till Lennart Lindén, UGIL konsult, för pedagogiken!

Vill inte

Kan inte



Vill personen inte, eller kan hon inte?

## Handläggning av akut agitation

1. Preliminär diagnos
  - Bedöm art och grad av agitation.
  - Uteslut intoxication och annan somatisk genes.
  - Samla information- journal, missbruksanamnes, u-toxscreening
1. Bedöm allvarlighetsgrad och våldsrisk
2. Lugna, motverka eskalering
  - Omvårdnadsåtgärder, dialog, stimulireduktion, samarbeta med personal, tät tillsyn av patienten
3. Frivillig medicinering: peroralt, ev intramuskulär injektion
4. Tvångsmedicinering: intramuskulär injektion

14

## Prioritera - ta hand om den mest laddade patienten först

En patient med aggressionsrisk utgör en medicinsk högrisksituation och en fara för sig själv, medpatienterna och personalen.

Låt inte denna patient vänta utan avbryt vad du håller på med och ta hand om honom NU.

15

## Konfusion

- **Konfusion är tills motsatsen är bevisad en somatisk sjukdom.**
- Vanligt konsultationsfall på somatiken.
- Några vanliga tillstånd att utesluta är hypoxi p g a kardiovaskulär sjukdom eller lungsjukdom, läkemedelsbiverkan, smärta, infektion, postoperativt, urinretention, obstipation, demens.
- Noggrant somatiskt status, missbruksanamnes, drogscreening, läkemedelsgenomgång, kontrollera läkemedelsförteckningen.

## Konfusion, forts

- Omvårdnadsåtgärder och läkemedelssanering i första hand.
- Symtomatisk behandling om patienten inte medverkar till nödvändig somatisk vård: Ospecifikt sederande alt. specifikt dämpande läkemedel.
- **Risperidon/Haloperidol** (tabl, lösning) 0,25-0,5mg x 1-2.
- Undvik bensodiazepiner. **Diazepam** 2,5-5 mg i m/i v x 1-3 i nödfall, för kraftigare sedation för att möjliggöra oundgänglig somatisk vård.
- Tvångsåtgärder enligt LPT kan vara tillämpligt som sistahandsåtgärd om ovanstående inte räcker och oundgänglig somatisk vård inte kan ges - "akut fara för patientens liv/hälsa."

## "Gränssättning"

- Felaktig gränssättning kan skapa konfliktsituationer.
- Tala om att det är beteendet som inte kan accepteras, inte patienten.
- Var tydlig med varför beteendet inte kan accepteras.
- Försök få patienten att själv föreslå alternativ till beteendet. "Hur kan du göra istället när du är så här arg, så att ingen kommer till skada?"

26

En "suicidriskbedömning" är aldrig bara en bedömning!



Varje samtal inverkar ofrånkomligen på patientens grad av suicidalitet. Frågan är inte OM du ska påverka denna risk, utan i VILKEN RIKTNING!

28



## Kan du hitta ett sätt att bli sams?

Den patient som  
från början inte var  
överhängande  
självmordsnära...

...kan mycket väl  
vara det efter ett  
samtal med någon i  
vården!



29

En "våldsriskbedömning" är  
aldrig bara en bedömning!



Varje samtal inverkar ofrånkomligen  
på patientens grad av aggressivitet.  
Frågan är inte OM du ska påverka  
denna risk, utan i **VILKEN**  
**RIKTNING!**

30

## "Svåra" barn - vuxnas tolkningar

### Tolkning

- Besvärlig
- Viljestark
- Enveten
- Manipulativ
- Omedgörlig
- Trotsig
- Krävande
- Uppmärksamhetskrävande
- Olämplig uppfostran
- Bortskämd



### Förhållningssätt

- Uppmuntra medgörlighet
- "Sätta gränser"
- "Lära barnet vem som bestämmer"



Din tolkning  
vägleder din  
intervention!

31

## Hur fri är den "fria viljan"?

Ett "fritt" handlande förutsätter bland annat att

- Vi förmår **uppfatta och tolka omvärlden** korrekt.
- Vårt handlande inte styrs av depressiva- eller andra **vanföreställningar**.
- Vårt handlande inte styrs av **outhärdlig ångest**.
- Vi kan **förstå konsekvenserna** av våra handlingar.
- Vi kan **behärska våra impulser**.
- Vi har **inlevelseförmåga**, så att vi förstår hur vårt handlande upplevs av andra.

Dessa förutsättningar är vanligen mer eller mindre nedsatta vid allvarlig psykisk sjukdom.

32

## Hur ser VÅRA kartor ut?

"Jobbiga" patienter - förslag till utgångspunkt

- Patienten gör alltid **sitt allra bästa**.
- Han har bara **inte kommit på** ett bättre sätt än.
- Kanske **kan du lära honom**, med hjälp av litet autentisk återkoppling?

33

När patienten uppfattas rigid -  
"följer inte avdelningens rutiner" -  
vem är det egentligen som är mest  
rigid?

35

## Åtta råd enligt Bergenprojektet (nr 4+9 egna tillägg)

1. Visa positiv respekt, patienten ska känna att du är där för att hjälpa till.
2. Lyssna!
3. Var närvarande, koncentrerad och visa intresse. Försök förstå varför patienten är upprörd och vad hon vill.
4. Bekräfta patientens känslor. De är förståeliga utifrån omständigheterna och hur patienten upplever situationen. "Du verkar upprörd. Inte konstigt när du förts hit mot din vilja."
5. Ge patienten tid att prata och ställa frågor. Prata med patienten flera gånger innan beslut fattas. Berätta för patienten vad som händer.
6. Tala lugnt, med mild röst.
7. Tänk på ditt kroppsspråk, håll avstånd och ögonkontakt.
8. Ge patienten förslag, i stället för att kritisera.
9. Fråga vad du kan göra för att hjälpa patienten med upprördheten. Kaffe? Promenad? Samtal?
10. Samarbeta i arbetsgruppen, tala med varandra, låt alla veta vad du gör.

36

## Några tankar från en klok ex-patient

- **Delaktighet är centralt.** Förutsätter att patienten får information.
- **Delaktighetstrappan:** information -> konsultation -> dialog -> samarbete -> medbestämmande.
- **Förklara SYFTET** med vården/inläggningen, liksom med eventuella formulär man ber att få ifyllda.
- **Förvarna om eventuella biverkningar**, för att inte äventyra förtroendet.
- **Målet är att patienten ska få den vård hen behöver, och att hen ser att hen får det.**
- **Vid bältesläggning:** Tala till patienten hela tiden, håll kontakten levande, fråga vad som hjälper och känns bra. Patienter är vår medmänniska även i de allra svåraste stunderna.

## Tips för att hantera människor i "röd zon"

- **Håll dig själv lugn**, höj inte rösten.
- **Var närvarande**, uppfatta vad som händer.
- **Ta ansvar för "klimatet"**. Vänlighet och mjukt tonfall.
- **Förmedla empati**, att du ser hans smärta.
- **"Kom" från rätt plats**: Visa att du är vän, på hans sida, att du vill väl.
- Logik, vädjan till det vuxna i den andre och humor fungerar vanligen inte.
- **Köp tid**: Erbjud kaffe, mat, vila, paus, betänketid, värme.
- **Begripliggör och normalisera**.
- **Be den andre om råd**.

38

## Arga, missnöjda och hotfulla människor

1. **Uppmärksamma de negativa känslorna**. Ta dem inte personligt, troligen handlar de egentligen inte om dig.
2. **"Stoppa" samtalet**, byt från innehåll till "process".
3. **Förmedla din upplevelse**. Fånga upp och förmedla den underliggande **KÄNSLAN!**
  - "För mig verkar det som att du är väldigt "upprörd"/arg just nu. **Är det så?**"
  - "Är det mig eller något jag gör i vårt samtal som du är upprörd över? Är det något som jag kan göra annorlunda?"
4. **Påpeka konsekvenserna**.
  - "När du är så här upprörd har jag svårt att veta hur jag ska tala med dig på ett sätt som du är hjälpt av."
5. **Fråga om det är något du kan göra** för att hjälpa den andre med de jobbiga känslorna, **så att ni sedan ska kunna komma vidare i samtalet**.
  - "Jag behöver din hjälp. Hur kan jag göra för att hjälpa dig med din upprördhet, så att vi sedan kan fortsätta vårt samtal?"

39

## Tvångsåtgärder?

- ❑ Tvångsinjektion skall alltid övervägas vid svår agitation med hotfullhet, utagerande, gravt störande beteende om patienten inte accepterar frivillig behandling.
- ❑ Hög våldsrisk eller gravt störande beteende: Överväg behandlingsbeslut enligt LPT 6 a §: **Fastspänning alt. avskiljning.**
- ❑ Tvångsinjektion enligt behandlingsbeslut LPT 6 a § (leg. läkare): Kräver vårdintyg + **"överhängande fara för patientens liv eller hälsa"**.
- ❑ Vid läkarens etiska ställningstagande gällande tvångsinsatser och patientens integritet: **Glöm inte att vi har ansvar även för personal och medpatienters säkerhet!**

40

Här följer de väsentligaste formuleringarna, bra att ha för att underbygga sin LPT-beslutsmotivering vid nattlig kognitiv underfunktion och vid resonemang med personal som anser att det vore lämpligt med någon tvångsinsats som det saknas lagstöd för i LPT.

**6 § När vårdintyg och kvarhållningsbeslut finns men intagningsbeslut enligt 6 b § ännu inte fattats:**

"Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att **hindra patienten att lämna den del av vårdinrättningen där patienten skall vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.**"

**19 § Fastspänning upp till fyra timmar:**

"Om det finns en **omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning.**"

**19 § Fastspänning mer än fyra timmar:**

"Om det finns **synnerliga skäl, får det beslutas att patienten ska hållas fastspänd längre än** [fyra timmar]."

**20 § Avskiljning upp till åtta timmar:**

"En patient får hållas avskild från andra patienter **endast om det är nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna.**"

**20 § Avskiljning mer än åtta timmar:**

"Om det finns **synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande [...]** avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar."

Det finns alltså inget rättsligt stöd för vare sig fastspänning eller avskiljning i syfte att ge patienten en bättre vård, hur önskvärt det än vore.

## Läkemedelsbehandling är inte ofarligt

- Malignt neuroleptikasyndrom
- Agranulocytos
- Klozapin utsättningssyndrom
- Postinjektion delirium/sederingssyndrom (Olanzapin)
  
- Serotonergt syndrom
- Litiumintoxikation
- Antikolinergt syndrom
- Förlängt QTC-syndrom och Torsades de Pointes
- Steven-Jonssons syndrom

## Hur göra med de ovanliga men potentiellt allvarliga tillstånden i praktiken?

- De är ovanliga, så det är svårt att hålla detaljerna i minnet.
- **Ha en hög inre beredskap** - förr eller senare händer det.
- **Var vaksam på alla**, även subtila, **förändringar** av oklart slag hos patienterna.
- Fundera då alltid på om det kan vara en reaktion på något av dessa läkemedel:
  - Neuroleptika
  - Klozapin
  - SSRI eller annat serotonergt verkande preparat
  - Litium
  - Antikolinergiskt preparat
  - Lamotrigin
- **Utred frikostigt** vid minsta misstanke, och ta hjälp av bakjour och invärtesmedicinare.

## Läkemedelsbehandling är inte ofarligt

Akuta tillstånd i psykiatri (personlig sammanfattning av två föreläsningar av Mussie Msgina våren 2015, Michael Rangne 2015-06-22)

Tillstånd	Utmärkande	Symtom	Utredning och lab	Behandling
Malignt neuroleptikasyndrom (MNL)	<p><b>Hyporeflexi, bradyreflexi (jfr SS)</b> Ökad risk vid dosökning (smyg alltid i NL)</p> <p>Alla nl (även Laponex) kan ge MNS, men vanligare vid typiska NL</p> <p>Vanligen 3-14 dagar efter insättning/dosökning, men kan komma efter flera års behandling</p> <p><b>Risikfaktorer:</b> Höga doser, plötslig dosökning, äldre NL underliggande hjärnskada, CVL, dehydrering, fysisk utmattning, agitation, katatoni, postpartum, malnutrition, <b>lågt s-järn</b>, lågt s-natrium,</p> <p>Atypiskt MNS av nyare NL: lindrigare förlopp, mindre x-pyramidala biverkningar, mindre rigiditet, mindre hypertermi</p>	<p><b>Neurologiska:</b> <b>Hypertermi (allvarligaste symtomet)</b> <b>Muskelrigiditet, tremor, rörelsestörning, katatoni, mutism</b> Sluddrigt tal Dysfagi Hyporeflexi, bradyreflexi</p> <p><b>Mentala:</b> <b>Sänkt/växlande medvetande, delirium, agitation</b></p> <p><b>Autonom instabilitet:</b> <b>Takykardi</b> Svettning Svängande blodtryck Inkontinens Mydriasis (pupillutvidgning) Inkontinens Dyspné, tacypné</p>	<p>Anamnes – förlopp, mediciner (samtliga syndrom) <b>Lågt p-järn</b> <b>Förhöjt CK, myoglobin LPK, Asat, Alat</b> Myoglobinuri och raddolys predicerar dödrisk</p>	<p><b>IVA</b>, livsuppehållande insatser (ej behandla inom psykiatri) Neurolog <b>Sätta ut NL</b>, även Phenergan, Lergigan m fl. <b>Nedkyning (febern dödar)</b> <b>Häva dehydreringen</b> Dantrolen, bromocriptin ECT Lorazepam</p> <p><b>Efter två veckor ev försiktigt återinsättning (kan ge samma preparat)</b></p>
Agranulocytos	<p>Av clozapin, ev karbamazepin</p> <p>Risikfaktorer: äldre kvinna, andra bennmärgshämmande lm (karbamazepin)</p> <p>80% inom tre månader efter behandlingsstart. Följ blodbild en gg/vecka i 18 veckor, sedan en gg/månad</p>	<b>Feber, infektionskänslighet, infektioner</b>	<p>LPK &lt; 3000/mm3, neutrofila granulocyter &lt; 1500</p> <p>Även vid eosinofili ska Laponex sättas ut (risk för organskada)</p>	<p><b>Eventuellt ha is i magen och följa tätt i st f akut utsättning</b>, Laponexutsättning kan ge mycket svåra symtom</p> <p><b>Kontraindicerat med återinsättning</b> om man väl satt ut (40% recidiverar, och då med värre förlopp)</p>

### Behandlingsalternativ vid akut agitation (psykos, mani, ospecifik)

#### Allmänt

- **Uteslut medicinsk orsak** (D-glukos, elektrolyter, njure, lever, tyroidea, Wernicke-Korsakov, hjärtfel, blodtryck, stroke, meningit, demens, urinvägsinfektion).
- **Uteslut intoxikation och abstinens** (alkohol, narkotika, läkemedel, suicidförsök).
- **Monitorera vitalparametrar och kliniskt status** tätt under behandlingen (medvetandegrad, andning, puls, blodtryck, temperatur).
- Ut med antidepressiva läkemedel och centralstimulantia.
- Ge tillräcklig tid för att kunna få effekt före nytt behandlingstillägg.
- Alltid ångestdämpande medicin till bälteslagd patient.
- 
- 

#### Peroral

- Theralen 40 mg/ml, 0,5–1,5 ml.
- Oxascand 20–25 mg.
- Stesolid 10–15 mg.
- Hämeiprenin (mixtur 50 mg/ml hellre än kapsler), 10–20 ml.
- Olanzapin munlösling 10–15 mg. Kan upprepas, men först efter en timme eftersom maximal plasmakoncentration uppnås först då.
- Haldol 5–10 mg.
- Nitrazepam 10 mg (till natten).

Vid mani kan kompletteras med:

- Lithionit, hög dos omgående (se Fass).
- Valproat 30 mg/kg/dygn, vanligen 2 gram/dygn. Om inte svar på neuroleptika inom ett par dagar, särskilt vid irriterabilitet/mixed state. OBS: teratogent, ej till kvinnor i fertill ålder.

#### Intramuskulärt

- Phenergan 25 mg/ml, 2–4 ml (licenspreparat). Långverkande, kraftigt sederande, förstahandspreparat vid mistänkt/konstaterat drogintag.
- Haldol 5 mg/ml, 1 ml. Kan upprepas med 1 ml efter en timme. Mycket motoriska biverkningar, sätt in Akineton v.b.
- **Cochrane: Kombination av Haldol och Phenergan bra vid agitation.** Dålig evidens för nyare neuroleptika och bensodiazepiner: Vaj Haldol eller 2:1 första hand.
- Ativan 4 mg/ml, 1–4 mg (licenspreparat). Kan upprepas efter 30 minuter, max 10 mg/dygn. Snabbt anslag, kort duration. **Förstahandsmedel vid ospecifik agitation.**
- Zyprexa (5-) 10 mg, kan upprepas efter två timmar. Max 30 mg total dos på 24 tim. **Förstahandsmedel vid agitation p.g a psykos, mani och psykotisk depression enligt en guide.**
- Zeldox 20 mg, kan upprepas efter två timmar, max 40 mg/dygn. OBS försiktighet vid äldre och dementa patienter.
- Cisordinol Accutard 1–2 ml, kan upprepas efter 24–48 timmar. Inte vid LPT 6 a 9.
- Iktorivil 1 mg, kan upprepas.
- Stesolid 5-20 mg, kan upprepas en gång. Svårstyrvt, undvik helst.

#### Inhalation

- Adsovue. Snabbt anslag, kort duration.

#### Sublingualt

- Midazolom.
- Sycrest.

#### ECT

- Synnerhet vid postpartumpsykos.

Michael Rangne 2015/2017 (tack till Carl-Johan Ekman för hjälpen!)



### Behandlingsalternativ vid akut agitation (psykos, mani, ospecifik)

#### Allmänt

- **Uteslut medicinsk orsak** (b-glukos, elektrolyter, njure, lever, tyroidea, Wernicke-Korsakov, hjärtfel, blodtryck, stroke, meningit, demens, urinvägsinfektion).
- **Uteslut intoxication och abstinens** (alkohol, narkotika, läkemedel, suicidförsök).
- **Monitorera vitalparametrar och kliniskt status** tätt under behandlingen (medvetandegrad, andning, puls, blodtryck, temperatur).
- Ut med antidepressiva läkemedel och centralstimulantia.
- Ge tillräcklig tid för att hinna få effekt före nytt behandlingstillägg.
- Alltid ångestdämpande medicin till bälteslagd patient.

54

### Behandlingsalternativ vid akut agitation (psykos, mani, ospecifik)

#### Peroralt

- Theralen 40 mg/ml, 1-2ml. Max 3 ggr/dag.
- Oxascand 20–30 mg. Max 3 ggr/dag.
- Diazepam 5–15 mg. Max 3 ggr/dag.
- Heminevrin (mixtur 50 mg/ml hellre än kapslar), 5–10 ml. Max 3 ggr/dag. Undvik högdosbehandling, kan ge andningsdepression.
- Olanzapin munlöslig 10–15 mg. Kan upprepas, men först efter en timme eftersom maximal plasmakoncentration uppnås först då.
- Haldol 5–10 mg.
- Nitrazepam 10 mg (till natten).
- Levomepromazin (Nozinan) 25mg: 1-4 st. Max 3ggr/dag.
- Klorprotixen (Truxal) 25mg: 1-2 st. Max 3ggr/dag.

55

### Behandlingsalternativ vid akut agitation (psykos, mani, ospecifik)

#### Peroralt

Vid mani kan kompletteras med:

- Lithionit, hög dos omgående (se Fass).
- Valproat 30 mg/kg/dygn, vanligen 2 gram/dygn. Om inte svar på neuroleptikal inom ett par dagar, särskilt vid irriterabilitet/mixed state. OBS: teratogent, ej till kvinnor i fertil ålder.

56

### Behandlingsalternativ vid akut agitation (psykos, mani, ospecifik)

#### Intramuskulärt

- Phenergan 25 mg/ml, 2–4 ml (licenspreparat). Långverkande, kraftigt sederande, förstahandspreparat vid misstänkt/konstaterat drogintag.
- Haldol 5 mg/ml, 1(-2) ml. Kan upprepas med 1 ml efter en timme. Mycket motoriska biverkningar, sätt in Akineton v b.
- **Cochrane: Kombination av Haldol och Phenergan bra vid agitation.** Dålig evidens för nyare neuroleptika och bensodiazepiner. Välj Haldol eller bz i första hand.
- Eventuellt synergistisk effekt av Phenergan och Lorazepam i kombination.
- Ativan 4 mg/ml, 2–4 mg (licenspreparat). Kan upprepas efter 30 minuter, max 10 mg/dygn. Snabbt anslag, kort duration.

**Förstahandsmedel vid ospecifik agitation.**

57

### Behandlingsalternativ vid akut agitation (psykos, mani, ospecifik)

#### Intramuskulärt

- Zyprexa (5-) 10 mg, kan upprepas efter två timmar. Max 30 mg total dos på 24 tim. **Förstahandsmedel vid agitation p g a psykos, mani och psykotisk depression enligt en guide.**
- Zeldox 20 mg, kan upprepas efter två timmar, max 40 mg/dygn. Obs försiktighet vid äldre och dementa patienter.
- Aripiprazol (Abilify), 9,75mg.
- Cisordinol Accutard 1–2 ml, kan upprepas efter 24–48 timmar. Inte vid LPT 6 a §.
- Iktorivil 1 mg, kan upprepas.
- Stesolid 10-20 mg, kan upprepas en gång. Svårstyrtd, oberäkneligt upptag, undvik helst.
- **Ge INTE injektion olanzapin i kombination med intramuskulär bensodiazepin. Risk för allvarlig respiratorisk och cirkulatorisk biverkan.**

58

### Behandlingsalternativ vid akut agitation (psykos, mani, ospecifik)

#### Inhalation

- Loxapin (Adasuve). Inhalation 9,1mg. Snabbt anslag, kort duration. Bronkospasm mindre vanlig biverkan, sällan allvarligt. Beta 2 -r stimulerare skall finnas tillgängligt.

#### Sublinguallt

- Midazolam.
- Sycrest.

#### ECT

- I synnerhet vid postpartumpsykos.

59

## SBU om val av läkemedel för sedering i akuta situationer för att minska risken för våld

- Sammanfattning mars 2017 av en systematisk översikt av kunskapsunderlaget gällande akut sedering, NICE 2015.
- **Slutsatserna bör tolkas med försiktighet** eftersom expertgruppen bedömde att de sammanvägda resultaten från de ingående studierna utgjorde evidens med otillräcklig eller begränsad tillförlitlighet.
- Slutsatserna ovan betyder inte att inte **även andra behandlingsalternativ kan vara effektiva**, bara att vi inte säkert vet.
- NICE:s rekommendationer bygger därför även till väsentlig del på **praktiska överväganden och expertgruppens samlade bedömning utifrån erfarenhet**.
- NICE:s expertgrupp fann inget underlag för att bedöma läkemedel för behandling av **barn och unga**.

60

## SBU om val av läkemedel för sedering i akuta situationer

- Man jämförde placebo, bensodiazepiner, neuroleptika och antihistamin, antingen enskilt eller i kombination, för behandling av patienter inom **psykiatrisk vård**.
- För **två behandlingsalternativ** bedömde NICE:s expertgrupp att nyttoeffekten översteg risken för biverkningar:
  - **Monoterapi med lorazepam** (en bensodiazepin; inj **Lorazepam/Ativan**, po **Temesta**).
  - **Kombinationsterapi med haloperidol** (ett antipsykotikum) och **prometazin** (ett antihistamin; inj **Phenergan**, po **Lergigan**).
- Kombinationen haloperidol och prometazin **minskar risken för extrapyramidala biverkningar**, och kan vara **mer effektiv** än enbart haloperidol. Tänk på att:
  - Det krävs två injektioner vid samma tillfälle.
  - Försiktighet bör iaktas om injektionen upprepas på grund av otillräcklig effekt, eftersom prometazin kan hämma metabolismen av haloperidol.
  - Prometazin har vävnadsretande egenskaper och måste injiceras djupt i muskeln.

61

## SBU om val av läkemedel för sedering i akuta situationer

- Patienter som är påverkade av **alkohol eller droger** utgör en särskild svårighet
  - Ökad risk för våldsamt beteende.
  - Drogen kan interagera med läkemedlet.
  - Svagt kunskapsläge.

62

## SBU om behandlingseffekten

- Ingen statistiskt säkerställd skillnad i behandlingseffekt:
  - mellan bensodiazepiner och antipsykotika.
  - då bensodiazepin kompletterades med antipsykotika.
  - då behandling med haloperidol kompletterades med bensodiazepin.
- **Bensodiazepin var mindre effektiv än antipsykotika i kombination med antihistamin**, eftersom risken för utebliven behandlingseffekt var mer än dubbelt så hög.
- **Bensodiazepin i kombination med antipsykotika var mindre effektiv än en kombination av antihistamin och antipsykotika.**
- Det gick inte att avgöra om **risken för biverkningar** skilde sig vid behandling med bensodiazepin jämfört med antipsykotikum i kombination med antihistamin.
- **Lorazepam var det behandlingsalternativ för vuxna som expertgruppen föredrog** efter att ha vägt samman behandlingseffekten och risken för biverkningar, särskilt i form av extrapyramidala symtom.

63

## SBU om olanzapin

- NICE-rapporten tar inte upp studier med olanzapin, men här nedan är några kommentarer från SBU.
- Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i **sedering** mellan olanzapin och bensodiazepin, men olanzapin gav en större förbättring av **beteendet**.
- Olanzapin och haloperidol var likvärdiga med avseende på hur mycket patientens **aggression** minskade efter sederingen.
- Haloperidol i kombination med antihistamin (prometazin) verkade **snabbare** än enbart olanzapin.

64

## SBU om annat av vikt vid behandlingen

- NICE rekommenderar att vårdpersonalen **övervakar patientens tillstånd** systematiskt efter att patienten getts akut sederande läkemedel.
- Det bör även finnas **rutiner för god dokumentation** som underlag för både individuell och organisatorisk utvärdering av läkemedelsstrategin och patientsäkerheten.
- Vårdpersonalen bör även ha **beredskap** utifall patientens hälsotillstånd akut skulle försämrats efter sederingen.
- **Lagstöd** behövs för all behandling mot patientens vilja.
- Patienten bör erbjudas **uppföljande samtal** efter tvångsåtgärd.

65

### Förslag på behandlingsval vid injektionskrävande agitation

- Raptus vid EIPS, autismspektrumstörning eller annat icke-psykotiskt tillstånd
  - Prometazin eller Lorazepam
- Psykos
  - Prometazin + Haldol + ev Cisordinol-Accutard
  - Alternativ är Lorazepam och Olanzapin
- Mani
  - Som vid psykos
  - Överväg tillägg med Litium i högdos och/eller valproinsyra om patienten medverkar till peroralt intag
- Extrem agitation/deliriös mani med excitation, tempstegring, otillräckligt dryckintag,
  - ECT

66

### Väl beprövad trippelbehandling vid svår psykos/mani

1. Prometazin 100 mg
2. Haldol 5-10 mg
3. Cisordinol-Accutard 100-150 mg
4. Eventuellt även Lorazepam 4 mg
5. Akineton vid eventuella extrapyramidala biverkningar

Följ vitalparametrar kontinuerligt

67

## Kloka listan 2017 (Janusinfo/Stockholms läns läkemedelskommitté)

Tillstånd	Första hand	Andra hand	Kommentar
Sömnstörning	Zopiklon		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort behandlingstid</li> <li>• Intermittent behandling</li> <li>• Utred och behandla orsaken</li> <li>• KBT effektivt vid sömnstörning</li> </ul>
		Propiomazin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olämpligt till äldre p g a risk för dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar</li> </ul>

## Kloka listan 2017 (Janusinfo/Stockholms läns läkemedelskommitté)

Tillstånd	Första hand	Andra hand	Kommentar
Tillfällig oro	Theralen Lergigan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psykologiskt stöd i första hand</li> <li>• Undvik till äldre (antikolinerga biverkningar)</li> </ul>
		Oxascand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort behandlingstid, intermittent behandling</li> <li>• Risk för konfusion, fall och kognitiv nedsättning hos äldre</li> </ul>
Ångestsyndrom Tvångssyndrom	Sertralin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De olika SSRI anses ha likvärdig effekt</li> <li>• KBT ensamt eller i kombination rekommenderas</li> </ul>
		Escitalopram Fluoxetin	
Depression	Escitalopram Sertralin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De olika SSRI anses ha likvärdig effekt</li> <li>• KBT ensamt eller i kombination rekommenderas</li> <li>• Följ med validerad skattningsskala</li> <li>• Byte till annat SSRI är lika effektivt som att byta till annan läkemedelsklass</li> <li>• SSRI ger ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi</li> </ul>
		Mirtazapin	Ringa antikolinerg effekt, kan ges även till äldre



## Kloka listan 2017 (Janusinfo/Stockholms läns läkemedelskommitté)

Tillstånd	Första hand	Andra hand	Kommentar
Bipolär sjukdom, förebyggande av skov	Lithionit		
		Tillägg av: Quetiapin Valproinsyra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ej till kvinnor i fertil ålder</li> </ul>
Depressivt eller maniskt skov	Lithionit och Quetiapin alt. Valproinsyra		<ul style="list-style-type: none"> <li>De flesta patienter behöver kombinationsbehandling</li> </ul>
Psykos	Aripiprazol (tabl eller depåinj) Risperidon (tabl eller depåinj)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Följ vikt, b-glukos, blodfetter</li> <li>Livsstilsåtgärder</li> <li>Depåinjektioner ofta att föredra vid långtidsbehandling</li> </ul>
		Klozapin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk för agranulocytos; följ blodstatus</li> <li>Följ vikt, b-glukos, blodfetter</li> <li>Livsstilsåtgärder</li> </ul>

## Kloka listan 2017 (Janusinfo/Stockholms läns läkemedelskommitté)

Tillstånd	Första hand	Andra hand	Kommentar
ADHD	Metylfenidat (Concerta, Ritalin, Ritalina, Equasym, Medikinet...)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsammans med andra multimodala insatser</li> <li>Långverkande preparat i första hand</li> </ul>
		Lisdexamfetamin (Elvanse)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atomoxetin eller guanfacin (barn) kan övervägas vid otillräcklig effekt</li> </ul>

## Kloka listan 2017 (Janusinfo/Stockholms läns läkemedelskommitté)

Tillstånd	Första hand	Andra hand	Kommentar
Alkohol, återfallsförebyggande	Akamprosat Naltrexon		
		Disulfiram	
Abstinens	Oxascand		
Brist på vitamin B1	Tiamin		

## Behandlingsalternativ vid ångest

- **Alimemazin** (Theralen) 20-40(-80)mg, 1-3 ggr/d
- **Prometazin** (Lergigan) 25-50mg, 1-3 ggr/d
- **Hydroxizin** (Atarax) 25-50mg, 1-3 ggr/d (max 100mg/d)
- **Quetiapin** (Seroquel) 25-50mg, 1-3 ggr/d
- **Levomepromazin** (Nozinan) 25mg: 1-2 st, 1-3 ggr/d



- **Oxazepam** (Oxascand, Sobril) 5-15mg, max 3 ggr/d



- **Diazepam** (Stesolid) 5mg-10mg, max 3 ggr/d

## Behandling av sömnstörning

- Ge inte bensodiazepiner/ "Z-preparat" till patient som ej läggs in.
- Samtliga icke beroendeframkallande hypnotika bör tas 1-2 h före sänggång, senast kl 21.
- Alla hypnotika är "insomningstabletter" om de tas i tid.
- Mani/psykos/svår depression: Ge kraftfull behandling. Patienten tål och behöver ofta höga doser.
- Betänk missbruksanamnes hos patient med svårbehandlad sömnstörning.

## Behandling av sömnstörning

- **Propiomazin** (Propavan) 25mg: 0,5-2 st
  - **Alimemazin** (Theralen) 20-40-80mg
  - **Quetiapin** 25mg: 25-100(-200+)mg
  - **Prometazin** (Lergigan) 25-50mg
  - **Hydroxizin** (Atarax) 25-50mg
  - **Zopiklon** (Imovane) 5mg-15mg
- ↓
- **Levomepromazin** (Nozinan) 25-100(-200)mg
  - **Nitrazepam** (Apodorm, Mogadon) 5-10 mg: Slutenvårdpreparat (f f a mani, svår psykos, svår agitation)
  - **Zolpidem** (Stilnoct): **Undvik!** Snabbt tillslag, ökad risk för ruseffekt, missbruk och biverkningar som konfusion och amnesi.



"Suicidal, men inte allvarligt psykiskt sjuk, så hon får ta ansvar själv."

## Bemötande av patienter med EIPS

- ❑ Bemötandet avgörande. **Fel bemötande försämrar patienten.**
- ❑ Utbildning specifikt om självskadebeteende ger ett bättre omhändertagande, men inte lång erfarenhet och formell utbildning.
- ❑ Bemötande som hjälper: **bli lyssnad på, bli förstådd, att behandlaren uppfattas som engagerad.**
- ❑ Patienten **manipulerar inte** - riktig manipulation märks inte!
- ❑ **Patienten gör så gott hen kan**, men har ett **outhärdligt liv**. Behöver ibland lära sig nya beteenden.



## Bemötande av patienter med EIPS

- **Empatiskt lyssnande och undersökande förhållningssätt.**
- **Våga fråga!** Öppet och nyfiket, inte dömande, inte ställa till svars.
- **Vilken funktion** har självskadebeteendet?
- Fokus på ökad emotionell medvetenhet och **förbättrad emotionsreglering.**
- Vad skulle kunna få ditt beteende/mående att **vända?**
- Uppmärksamhet, omtanke och intresse för hela människan och inte bara för självskadebeteendet. **Hur mår du, du som skadat dig?**
- Kontroll av patientens beteende minskar dennes autonomi och egenmakt, blir till en ond cirkel.

99

## Bemötande av patienter med EIPS

- Patienten har ofta problem med emotionell förståelse och känsloreglering. **Stäm av att patienten uppfattat rätt** vad du sagt och vad ni ska göra. Lyssna och återkoppla oavbrutet. **Har jag förstått dig rätt?**
- **Vårdgivaren blir själv känslomässigt dysreglerad** vid självskadebeteende. **Vi behöver kunna lugna oss själva.**
- **Lyssna till dina känslor** av att det inte går helt bra, använd dina känslor som det redskap de är.

101

## Att tänka på vid beroendetillstånd

- En påverkad patient är en medicinsk högriskpatient.
- Hög beredskap för akut internmedicinsk konsultation och IVA-vård.
- Vanligt med allvarliga somatiska komplikationer
- Försiktigt med läkemedel ö h t. Risk för ökad sedering, andningsdepression, minskad syresättning, blodtrycksfall, medvetlöshet.
- Börja med låga doser med försiktig dosökning under tät observation på effekterna.
- En påverkad patient kan reagera oförutsägbart, paradoxalt eller oväntat starkt på läkemedel.
- Övervaka patientens vitalparametrar fortlöpande
  - Andning
  - Puls
  - Medvetandegrad
  - Blodtryck
  - Temperatur

104

## Att tänka på vid beroendetillstånd

- Oklart tillstånd med trolig substanspåverkan
  - Försiktigt med läkemedel.
  - Phenergan i försiktig dosering (2 ml, inte 4). Risk för minskad saturation.
  - Följ vitalparametrar inkl, saturationsmättnad.
- Bälteslagd patient med oklart tillstånd, ej lämnat urinsticka
  - Som ovan.
  - Extravak obligatoriskt.

105

## Att tänka på vid beroendetillstånd

- Alkoholpåverkan
  - Försiktigt med läkemedel ö h t. Risk för ökad sedering, andningsdepression, minskad syresättning, blodtrycksfall, medvetslöshet.
  - Ej bensodiazepiner eller opiater!
  - Bensodiazepiner vid abstinens trots påverkan.
  - Lergigan, Phenergan, Theralen eller Haldol.
  
- Alkoholabstinens
  - Svår abstinens: bensodiazepiner (oxascand eller stesolid).
  - Lindrig abstinens: Atarax, Lergigan eller Theralen.

106

## Att tänka på vid beroendetillstånd

- Bensodiazepinpåverkan
  - Vanligen ingen farmakologisk behandling
  - Övervaka vitalparametrar
  - Lanexat vid svår påverkan/intoxikation (narkosläkare/IVA)
  
- Amfetaminpsykos
  - Försiktigt med läkemedel ö h t. Risk för ökad sedering, andningsdepression.
  - Ej lågdosneuroleptika som t ex Haldol.
  - Olanzapin eller bensodiazepin okay
  
- THC
  - Inga särskilda restriktioner, behandla den psykiatriska komplikationen.

107

## Att tänka på vid beroendetillstånd

- Opiatpåverkan
  - Behöver vanligen ej farmakologisk behandling, däremot tät övervakning av medvetande och andning.
  - Försiktigt med läkemedel! Risk för ökad sedering, andningsdepression.
  - Ej bensodiazepiner ("dubbel" andningsdepression)!
  - Lergigan eller Theralen vid svår ångest.
  - Ev Naloxon vid andningsdepression.
  
- THC
  - Inga särskilda restriktioner, behandla den psykiatriska komplikationen.

108







Problem?

Vad hade du väntat dig?

Det är en myt att man kan åstadkomma en god kommunikation med alla om man bara använder rätt teknik - det krävs två för en tango.



När som helst  
kan vad som helst  
hända vem som helst

115

ANSVAR OCH KONTROLL ÄR  
INTE SAMMA SAK

VI KAN TA ANSVAR FÖR  
PROCESSEN -

MEN RESULTATET RÅDER VI  
INTE ÖVER

DET ENDA DU KAN GÖRA ÄR ATT  
VATTNA DITT ÄPPELTRÄD

(MEN GLÖM INTE ATT VATTNA)



## Var observant på dina egna reaktioner och känslor i samtalet

- Arg/förbannad?
- Ledsen?
- Besviken?
- Orolig?
- Rädd?
- Misslyckad?
- Glad?
- Nöjd?
- Fantastisk?
- Förälskad?

Känslorna är ditt roder, så var tacksam för dem och lyssna noga

118



### När relationen går snett



“Det är aldrig kärleksfullt mot dig själv eller någon annan att vara någon annans dörrmatta eller låta sig utnyttjas.”

...men i det akuta läget kan det vara livräddande!


Tack till Kay Pollak

## "Gränssättning"

- Felaktig gränssättning kan skapa konfliktsituationer.
- Tala om att det är beteendet som inte kan accepteras, inte patienten.
- Var tydlig med varför beteendet inte kan accepteras.
- Försök få patienten att själv föreslå alternativ till beteendet. "Hur kan du göra istället när du är så här arg, så att ingen kommer till skada?"

122

## "Gränser"



123

## Det är ingen match




124

## Vad menas med "terapeutisk allians"?

### Den terapeutiska relationen/alliansen

1. Affektiv relationell komponent inkluderande **det känslomässiga bandet och anknytningen** mellan patient och behandlare.
2. **Samarbetsaspekt** - man är överens om behandlingens mål och medel.



## Det viktigaste

- Sällan fråga om teknik eller metod.
- **Gott hjärta, sunt förnuft, tid och basala kunskaper** om psykologi och psykisk ohälsa är det viktigaste.
- Kunskaperna ger dig självförtroende och skapar trygghet och tillit hos patienten.

## Hyfs och respekt

- Gott allmänmänniskt **bemötande**.
- Patienten är mer än sina åsikter och sin diagnos.
- Vårda **relationen**.
  - Integritet
  - Likvärdighet
  - Samarbete
- **Skapa ett "rum" mellan er** där ni har det ni pratar om.
- Ni sitter i var sitt **"utsiktstorn"**.
  - Tänk på att patientens utsikt är lika verklig för honom som din är för dig.
  - Be patienten berätta om sin utsikt.
  - Prata om hur det ser ut från ditt torn.

128




**Terrängen** - världen som den faktiskt ser ut

**Kartan** - vår bild av världen

**Visionen, förväntningarna** - världen som vi vill att den ska se ut, hur det skulle kunna vara

131

### "Kränkta" människor



**Terrängen**

Den andres bild av världen

Världen som den andre vill att den ska se ut

"Kränkningen" ligger här

132





Ni deltar inte i samma samtal

*Råd för krisstödsarbete, modifierade från Terapins gåva av Irvin D Yalom*



Ett test på en människas personlighet

Hur reagerar hon när hon  
*inte får som hon vill?*


134



En "suicidriskbedömning" är  
aldrig bara en bedömning!

Varje samtal inverkar ofrånkomligen  
på patientens grad av suicidalitet.  
Frågan är inte OM du ska påverka  
denna risk, utan i **VILKEN**  
**RIKTNING!**

135



90% av alla suicid har sin  
bakgrund i depression,  
alkoholism, stress eller  
krisreaktioner

136

En patient med självmordstankar  
behöver krisintervention




Självmord är patientens lösning på ett  
"olösligt" problem.

Hjälp honom finna en bättre lösning (eller  
att acceptera att problemet inte är ett  
"problem" utan ett villkor han måste lära  
sig leva med).

137

"Hon är bara ensam"



138

Patienten bara "suicidhotar"...



139

Patienten som "suicidhotar"...

**...är kanske suicidal!**



140



## Hur fri är den "fria viljan"?

Ett "fritt" handlande förutsätter bland annat att

- Vi förmår **uppfatta och tolka omvärlden** korrekt.
- Vårt handlande inte styrs av depressiva- eller andra **vanföreställningar**.
- Vårt handlande inte styrs av **outhärdlig ångest**.
- Vi kan **förstå konsekvenserna** av våra handlingar.
- Vi kan **behärska våra impulser**.
- Vi har **inlevelseförmåga**, så att vi förstår hur vårt handlande upplevs av andra.

Dessa förutsättningar är vanligen mer eller mindre nedsatta vid allvarlig psykisk sjukdom.

Det är sjukvården som misslyckats  
- inte patienten!



143

En "våldsriskbedömning" är  
aldrig bara en bedömning!



Varje samtal inverkar ofrånkomligen  
på patientens grad av aggressivitet.  
Frågan är inte OM du ska påverka  
denna risk, utan i **VILKEN**  
**RIKTNING!**

144

## Hur ser VÅRA kartor ut?

"Jobbiga" patienter - förslag till utgångspunkt

- Patienten gör alltid **sitt allra bästa**.
- Han har bara **inte kommit på** ett bättre sätt än.
- Kanske **kan du lära honom**, med hjälp av litet autentisk återkoppling?

145

"Det handlar om att man kommer med olika bakgrunder och olika förväntningar till mötet mellan patient och läkare på akuten. Om man **envisas med att behålla sin egen syn** på saker, då blir mötet ju jättedåligt."

## Situationen i ett nötskal

### Patientens utgångsläge

- Plågad
- Olycklig
- Sårbar
- Utlämnad
- Rädd
- Belastning
- "Fel"
- Skam
- Skuld

### Vår uppgift

- Hjälpa patienten känna att han är okay ändå
- Minska skuld- och skamkänslorna
- Minska lidandet

147

## Inse att det INTE handlar om:

Rätt eller fel  
 Gott eller ont  
 Moral eller skuld  
 Svaghet eller styrka  
 Vilken sorts människa man är

Det handlar om en sjukdom!



## Vi kan SKAPA besvärliga klienter

1. I vårt huvud
2. Med vårt beteende
3. Genom vår organisation



Människor som behandlas respektlöst, inte får sina djupare behov tillfredsställda, inte blir tagna i anspråk osv BLIR besvärliga!


149

## Diskutera

Du har en rigid, oflexibel och explosiv patient framför dig...


...vilket är nu den säkraste metoden för att åstadkomma en rejäl urladdning?

## Några olämpliga tillvägagångssätt




- **Respektlöst bemötande.**
- Ljuga eller **lova saker** man inte säkert vet att man kan hålla.
- Höga hästar, **maktspråk.**
- Insistera på **rutiner för rutinernas skull.**

När det inte går bra - kan den andre inte, eller vill han inte?




VS



## "Svåra" barn - beteenden

- Oflexibla
- Explosiva
- Lättfrustrerade
- Häftiga vredesutbrott
- Olydnad
- Impulsivitet
- Instabilt humör
- Aggressivitet



153

## Utbrottets faser

Ånglås/hjärnlås/kortslutning



Vätkorsningen



Härds smälta

Lugnar sig,  
förhindrar  
utbrottet



## Korgmodellen



A. Beteenden värda att sätta igång och uthärda ett utbrott för.



B. Viktiga, men inte värda ett utbrott. Här man lär barnet flexibilitet och frustrationstolerans. Här finns de kognitiva kartorna.



c. Oviktiga beteenden. Ej värda mer uppmärksamhet.

155

## Några råd för att undvika våld

- Förutse.
- Förebygg.
- Lyssna på dina inre varningsklockor.
- Lyssna på andra som känner patienten.
- Sitt inte ensam med hotfull eller potentiellt farlig patient.
- Sitt närmast dörren.

156

## Några råd för att undvika våld

- Tillgång till larm.
- Vaktare eller polis i beredskap vid allvarlig våldsrisk.
- Tänk på hur du bemöter patienten. Rädda patienter slåss för livet, kränkta slåss för hedern.
  - Vänlighet, varsamhet.
  - Empati.
  - Bekräfta patientens känslor.
  - Ilska och högljuddhet bemöts med mildhet och låg röst.

157

## Prioritera - ta hand om den mest laddade patienten först

En patient med aggressionsrisk utgör en medicinsk högrisksituation och en fara för sig själv, medpatienterna och personalen.

Låt inte denna patient vänta utan avbryt vad du håller på med och ta hand om honom NU.

158

## Undvik


- Maktspråk
- Arrogans
- Integritetskränkning
- Provokation
- Ifrågasättande
- Allmän ovänlighet och otrevlighet
- Att höja rösten
- "Nu får du lugna ner dig!"
- Att stirra

159

## Välj vad du bråkar om

1. **Behovskonflikt** - våra **behov** krockar.
2. **Värderingskonflikt** - vi **tycker olika** om något.

## "Svåra" barn - vuxnas tolkningar



### Tolkning

- Besvärlig
- Viljestark
- Enveten
- Manipulativ
- Omedgörlig
- Trotsig
- Krävande
- Uppmärksamhetskrävande
- Olämplig uppfostran
- Bortskämd



### Förhållningssätt

- Uppmuntra medgörlighet
- "Sätta gränser"
- "Lära barnet vem som bestämmer"

Din tolkning  
vägleder din  
intervention!

161

När patienten uppfattas rigid -  
"följer inte avdelningens rutiner" -  
vem är det egentligen som är mest  
rigid?

162

Vad menas med att Kalle är "besvärlig"?

Han gör inte som jag vill?!

163







Det finns människor som ingen jävel vill se [...] det finns människor som bara Gud orkar med..."



"En människa som bara en mamma kan älska."



## En fruktbar utgångspunkt?


Patientens beteende är alltid meningsfullt...  
...även om vi inte alltid lyckas *förstå* meningen!

Att fråga "varför" fungerar sällan.  
Pröva i stället:

Hur tänker du nu?  
Hur tänkte du då?

167

Den besvärlige har ofta ingen aning om vad han  
håller på med



168





"Det ligger  
något i det du  
säger."

169

Besvärlig typ?

Där står ju ett stackars ledset  
och övergivet barn och bönar  
om bekräftelse!





## Vägar att hantera stress

### Problemlösning

Övertala, söka medkänsla, avvakta, väcka skuld känslor, gnälla, spela modig, visa förakt



### Kamp-/flyktprogram

Gaspådrag - sympatiska nervsystemet




### "Spela död"-program


Broms - parasympatiska nervsystemet

173

Vilken del av hjärnan är för tillfället inkopplad?



Neocortex, "grön zon":  
Intellekt, empati, humor,  
vädja, be, resonera...



Limbiska systemet, "röd zon":  
Känslor, drifter,  
självkänsla, religion,  
värderingar...

Reptilhjärnan:  
Flykt, anfall, spela  
död...

174

Tack till Lennart Lindén, UGIL konsult, för pedagogiken!

## "Stresströskeln"

Stor skillnad mellan olika personers förmåga att hantera stress på ett konstruktivt vis. **Vi har alla vår personliga stresströskel.**

Under den fungerar vi ändamålsenligt. **Överskrids den börjar vi klicka;** hjärnan står allt mindre under vår viljemässiga kontroll.

**De kognitiva förvrängningarna ökar då kraftigt,** och kroppen slår om till de automatiska försvarssystemen - "fight or flight" eller "play dead".

Dessa försvarssystem är dock inte alltid så funktionella i vårt nuvarande samhälle.

175

## Personlighet och stress

I situationer där individen känner sig särskilt utsatt

- t ex när hon känner sig pressad av auktoriteter eller upplever sitt självbestämmande hotat -

förstärks ofta aggressivt, utagerande och besynnerligt beteende.

176

## Andras aggression

Vanligen ett uttryck för frustrerade önskingar och behov, eller andra former av stressupplevelser. Vad behöver han just nu?



**"Jag ser att du är upprörd. Hur kan jag hjälpa dig?"**

177

## Den missnöjde vill något - vad?

- ❑ Den som är missnöjd vill något, vill få något som hen just nu inte tycker sig få.
- ❑ Sitt på **samma sida** om bordet, lägg ut problemet "på bordet".
- ❑ **Beskriv vad du ser**, fråga om du uppfattat det rätt.
- ❑ **Fråga** vad du själv, patienten och ni gemensamt skulle kunna göra för att komma tillrätta med problemet.
- ❑ Vid kommunikationssvårigheter och missförstånd: **Be den andre återge** precis vad hen tyckte sig höra att du sa.



178

Alla människor har behov, alla vill *något*



Identifiera och tillfredsställ  
människors behov

179

Hör jag bara orden missar jag kanske allt!

Ord



Känslor



Önskningar



Medvetna behov



Omedvetna, fundamentala mänskliga behov



Hört det förut?

## Motivation är grunden

Hjälp den andre hitta ett varför - ett eget varför - för de önskade förändringarna.

181

## Om att skapa en allians - en början

- Alla vill något.
- Finn ut (fråga!) vad just denne person vill.
- Bekräfta önskemålet.
- Förmedla att du vill hjälpa patienten att uppnå detta.


## Önskan eller behov?

Vad den andre **vill och önskar**

- Vi måste börja här; intressera oss för och ta reda på.

Vad medarbetaren **behöver**

- Vi måste intressera oss även för detta, utan att sätta oss över medarbetaren eller reducera honom till objekt.



## Lathund för fungerande kommunikation

- **Försök först att förstå**, först därefter att själv bli förstådd.
- Dörröppnare: "berätta mer".
- **Lyssna efter DEN UNDERLIGGANDE KÄNSLAN.**
- "Spegla" vad du uppfattar att den andre säger.
- **Bekräfta** patienten, visa att du tycker hans känsla är förståelig och okay.
- **Använd "jagbudskap"**.

Allt det som är viktigt vid bemötandet av "vanliga" människor är *ännu* viktigare här!

- Alliera dig. Visa att du bryr dig och vill väl.
- Vänlighet och empati.
- Ilska och högljuddhet bemöts med mildhet och låg röst.
- Bekräfta den andres känslor, förmedla att de är förståeliga och okay.
- Ta på allvar och visa respekt.
- Kränk *aldrig* människor! Rädda människor slåss för livet, kränkta slåss för hedern.

### Sex gyllene regler för god psykisk hälsa

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Sov:           | Goda sömnvanor, 6-9 timmar/natt                                  |
| 2. Knyt band:     | Till familj, vänner, medmänniskor                                |
| 3. Motionera:     | Gärna 3 x 30 min/vecka   |
| 4. Ät:            | Sunda kostvanor  |
| 5. Fortsätt lära: | Behåll nyfikenheten, testa nya saker                             |
| 6. Ge:            | Tid, kärlek, uppmärksamhet                                       |
| 7. KASAM:         | Sök meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (eget tillägg) |

Ref: *Mental capital and wellbeing: making the most of ourselves in the 21st century, 2008*  
192